

ANALISI MATEMATICA 3
(ELM+TEM)
A.A. 2011-2012
ESERCIZI - parte prima

March 16, 2012

1 Trasformata di Fourier

Notazione : indichiamo con $u(t)$ la funzione scalino, ossia

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

ESERCIZIO 1.1 - Stabilire quali delle seguenti funzioni è trasformabile secondo Fourier in L^1 e/o in L^2 .

$$\begin{aligned} f_1(t) &= e^{-t}; & f_2(t) &= e^{-t}u(t); & f_3(t) &= e^t; & f_4(t) &= e^t u(t); \\ f_5(t) &= e^{-|t|}; & f_6(t) &= e^t[u(t) - u(t-7)]; & f_7(t) &= \frac{1}{t}u(t); \\ f_8(t) &= \frac{1}{t}u(t-5); & f_9(t) &= \frac{1}{t^2}u(t); & f_{10}(t) &= \frac{1}{t^2}u(t-6); \\ f_{11}(t) &= \frac{1}{t-4}u(t-4); & f_{12}(t) &= \frac{1}{t-4}u(t-7); \\ f_{13}(t) &= \frac{1}{(t-4)^3}u(t-7); & f_{14}(t) &= \frac{1}{\sqrt{t}}[u(t) - u(t-4)]; \\ f_{15}(t) &= \frac{1}{\sqrt{t}}u(t-4). \end{aligned}$$

ESERCIZIO 1.2 - A quale delle funzioni di cui all'Esercizio 1.1 è applicabile il Teorema di Plancherel?

ESERCIZIO 1.3 - Si considerino le funzioni

$$g_1(t) = 5t^2[u(t) - u(t - 9)]$$

$$g_2(t) = (\sin t)e^{-t^2}$$

$$h_1(t) = g_1(t - 4)e^{jt}$$

$$h_2(t) = g_2(t + \pi)e^{-3jt}.$$

Tali funzioni sono trasformabili secondo Fourier in L^1 ? E in L^2 ? In caso affermativo la trasformata di Fourier è continua? E' derivabile? Se sì, quante volte?

ESERCIZIO 1.4 - Quali delle seguenti funzioni razionali sono trasformate di Fourier in L^2 ?

$$F_1(\omega) = \frac{\omega + j}{\omega + 1}; \quad F_2(\omega) = \frac{\omega + j}{\omega^2 + 1};$$

$$F_3(\omega) = \frac{\omega + j}{\omega^2 - 1}; \quad F_4(\omega) = \frac{7\omega + 2}{\omega^2 + 9};$$

$$F_5(\omega) = \frac{\omega^2 + 7\omega + 2}{\omega^3 + 9}; \quad F_6(\omega) = \frac{\omega^2 + 7\omega + 2}{\omega^4 + 9}.$$

ESERCIZIO 1.5 - Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, reale dispari e a supporto compatto. Sia F la sua trasformata di Fourier. Quanto vale $F(0)$?

ESERCIZIO 1.6 - Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, e sia F la sua trasformata di Fourier. E' vera l'affermazione

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \omega F(\omega) ?$$

ESERCIZIO 1.7 - Le funzioni F_1 e F_3 definite nell'Esercizio 1.4 sono trasformate di Fourier di funzioni $f \in L^1(\mathbb{R})$? E le funzioni $F_1(\omega)e^{j\omega}$, $F_3(\omega)e^{-j\omega}$, $F_1(\omega - 4)$, $F_3(\omega + 1)e^{\omega}$, $F_1(\omega)e^{-\omega}$?

RISPOSTE:

Esercizio 1.1 : sono trasformabili in L^1 e in L^2 le funzioni $f_2, f_5, f_6, f_{10}, f_{13}$. Sono trasformabili in L^2 e non in L^1 le funzioni f_8, f_{12} . E' trasformabile

in L^1 e non in L^2 la funzione f_{14} . Le altre funzioni non sono trasformabili né in L^1 né in L^2 .

Esercizio 1.2 : E' applicabile alle funzioni trasformabili in L^2 , ossia a $f_2, f_5, f_6, f_8, f_{10}, f_{12}, f_{13}$.

Esercizio 1.3 : tutte le funzioni considerate ammettono trasformata sia in L^1 che in L^2 . Poiché sono trasformabili in L^1 , le trasformate sono funzioni continue. Applicando la proprietà della "moltiplicazione per t " e i suoi corollari, si ha che tutte le trasformate sono di classe C^∞ .

Esercizio 1.4 : sono trasformate in L^2 le funzioni F_2 e F_4 . Non lo sono le altre.

Esercizio 1.7: nessuna delle funzioni indicate è trasformata di Fourier di $f \in L^1$.